

TABELA 11 –
ALTURA TOTAL MÉDIA POR CLASSE DIAMÉTRICA E POR ESPÉCIES FLORESTAIS
DE OCORRÊNCIA EM UM TRECHO DE FORMAÇÃO DE RESTINGA
NA FAZENDA CAROARA, SÃO JOÃO DA BARRA-RJ.

Nome Científico	Classe de DAP			
	05-10	10-15	15-20	20-25
<i>Eugenia pluriflora</i>	3,7	4,2		
<i>Byrsonima sericea</i>	3,6	4,3	7,0	
<i>Calombo vermelho</i>	4,9	5,5		
<i>Capororoquinha</i>	3,5			
<i>Capparis flexuosa</i>	3,5	4,0		
<i>Clusia hilariana</i>	4,0	4,9	4,8	4,5
<i>Coccoloba alnifolia</i>	3,3			
<i>Cupania emarginata</i>	4,6	4,8		
<i>Diospyros inconstans</i>	3,3	6,5	7,3	
<i>Erythroxylum passarinum</i>	3,3			
<i>Eugenia aff moraviana</i>	3,4			
<i>Eugenia ovalifolia</i>	3,1	5,0		
<i>Eugenia sp 02</i>	3,6	4,0		3,3
<i>Ficus sp 01</i>	3,7			
<i>Ficus sp 02</i>	3,0			
<i>Garcinia brasiliensis</i>	4,4	4,8	5,0	5,5
<i>Guapira pernambucensis</i>	3,8			
<i>Indet 1</i>	5,5			
<i>Manilkara subsericea</i>	4,1	6,1	5,5	
<i>Marlierea sp</i>	3,9			
<i>Morta</i>	3,3			
<i>Myrciaria tenella</i>	3,0			
<i>Pera glabrata</i>	3,9	5,4	4,8	
<i>Protium heptaphyllum</i>	3,7	4,4		
<i>Pseudobombax grandiflorum</i>	3,4	4,0		
<i>Psidium cattleianum</i>	3,9	4,4		
<i>Rapanea umbellata</i>	4,1	4,5		
<i>Schinus terebinthifolius</i>	3,5			
<i>Scutia arenicola</i>	5,0			
<i>Tapirira guianensis</i>	2,9	4,5	6,7	4,8