

TABELA 5 –
VOLUME TOTAL POR CLASSE DIAMÉTRICA E POR ESPÉCIES FLORESTAIS DE OCORRÊNCIA,
AMOSTRADAS EM UM TRECHO DE FORMAÇÃO DE RESTINGA NA FAZENDA CARUARA, SÃO JOÃO DA
BARRA-RJ.

| Nome Científico | Classes de DAP | | | | |
|----------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 05-10 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | Total |
| <i>Eugenia pluriflora</i> | 1,13540531 | 0,094915112 | | | 1,230320423 |
| <i>Byrsonima sericea</i> | 0,419416858 | 0,166259285 | 0,111016117 | | 0,69669226 |
| <i>Calombo vermelho</i> | 0,237615101 | 0,235697895 | | | 0,473312996 |
| <i>Capororoquinha</i> | 0,014635569 | | | | 0,014635569 |
| <i>Capparis flexuosa</i> | 0,723283956 | 0,229418131 | | | 0,952702086 |
| <i>Clusia hilariana</i> | 0,12352313 | 0,220876218 | 0,096439788 | 0,175370608 | 0,616209744 |
| <i>Coccoloba alnifolia</i> | 0,01443636 | | | | 0,01443636 |
| <i>Cupania emarginata</i> | 1,177305359 | 0,370750029 | | | 1,548055388 |
| <i>Diospyros inconstans</i> | 0,159904459 | 0,048792023 | 0,09434131 | | 0,303037792 |
| <i>Erythroxylum passerinum</i> | 0,036680464 | | | | 0,036680464 |
| <i>Eugenia aff moraviana</i> | 0,088227715 | | | | 0,088227715 |
| <i>Eugenia ovalifolia</i> | 0,248428738 | 0,034349403 | | | 0,282778142 |
| <i>Eugenia sp 02</i> | 0,22016275 | 0,02188692 | | 0,067477116 | 0,309526787 |
| <i>Ficus sp 01</i> | 0,045388334 | | | | 0,045388334 |
| <i>Ficus sp 02</i> | 0,008023075 | | | | 0,008023075 |
| <i>Garcinia brasiliensis</i> | 0,366983091 | 0,27766778 | 0,077065173 | 0,122585133 | 0,844301177 |
| <i>Guapira pernambucensis</i> | 0,01279751 | | | | 0,01279751 |
| <i>Indet 1</i> | 0,025645769 | | | | 0,025645769 |
| <i>Manilkara subsericea</i> | 3,816377073 | 1,036141207 | 0,079038914 | | 4,931557194 |
| <i>Marlierea sp</i> | 0,05665294 | | | | 0,05665294 |
| <i>Morta</i> | 0,01095997 | | | | 0,01095997 |
| <i>Myrciaria tenella</i> | 0,226429782 | | | | 0,226429782 |
| <i>Pera glabrata</i> | 0,69024322 | 0,274530355 | 0,182088265 | | 1,14686184 |
| <i>Protium heptaphyllum</i> | 1,049209812 | 0,712556463 | | | 1,761766275 |
| <i>Pseudobombax grandiflorum</i> | 0,072813332 | 0,032682577 | | | 0,105495909 |
| <i>Psidium cattleianum</i> | 0,420472286 | 0,199154191 | | | 0,619626477 |
| <i>Rapanea umbellata</i> | 0,219929427 | 0,042083024 | | | 0,262012451 |
| <i>Schinus terebinthifolius</i> | 0,010330972 | | | | 0,010330972 |
| <i>Scutia arenicola</i> | 0,012478641 | | | | 0,012478641 |
| <i>Tapirira guianensis</i> | 0,069585491 | 0,184999501 | 0,301868877 | 0,155471916 | 0,711925786 |
| Total | 11,7133465 | 4,182760114 | 0,941858444 | 0,520904775 | 17,35886983 |