

Quadro 1 - Zooplâncton - registrados na Baía de Sepetiba, RJ

FILO CNIDARIA
<p>Classe Hydrozoa</p> <p>Subclasse Anthomedusae</p> <p><u>Ordem Filifera</u></p> <p>Subordem Margelina</p> <p>Família Bougainvilliidae</p> <p><i>Bougainvillia ramosa</i> (van Beneden, 1844)</p> <p>Família Eucodoniidae</p> <p><i>Eucodonium brownei</i> Hartlaub, 1907</p> <p>Família Hydractiniidae</p> <p><i>Podocoryne minima</i> (Mayer, 1900)</p> <p>Subordem Tiarida</p> <p>Família Pandeidae</p> <p><i>Amphinema australis</i> (Mayer, 1900)</p> <p><u>Ordem Capitata</u></p> <p>Subordem Tubulariida</p> <p>Família Corymorphidae</p> <p><i>Euphysora gracilis</i> (Brooks, 1882)</p> <p><i>Vannuccia forbesii</i> (Mayer, 1894)</p> <p>Família Tubulariidae</p> <p><i>Ectopleura dumortieri</i> (van Beneden, 1844)</p> <p>Subordem Zancleida</p> <p>Família Zancleopsidae</p> <p><i>Zancleopsis dichotoma</i> Hartlaub, 1907</p> <p>Subclasse Leptomedusae</p> <p><u>Ordem Conica</u></p> <p>Família Eucheilotidae</p> <p><i>Eucheilota duodecimalis</i> A. Agassiz, 1862</p> <p><i>E. paradoxa</i> Mayer, 1900</p> <p><u>Ordem Proboscidea</u></p> <p>Família Campanulariidae</p> <p><i>Obelia</i> sp.</p> <p><i>Phialidium hemisphaericum</i> (Linnaeus, 1767)</p> <p>Família Phialuciidae</p> <p><i>Phialucium carolinae</i> (Mayer, 1900)</p> <p>Subclasse Narcomedusae</p> <p>Família Cuninidae</p> <p><i>Cunina</i> sp.</p> <p><i>Cunina octonaria</i> McCrady, 1859</p> <p>Família Solmarisidae</p> <p><i>Solmaris solmaris</i></p>

Subclasse Trachymedusae

Ordem Trachylina

Família Geryoniidae

Liriope tetraphylla (Chamisso & Eysenhardt, 1821)

Família Rhopalonematidae

Rhopalonema velatum Gegenbaur, 1857

Subclasse Siphonophorae

Ordem Calycophorae

Família Diphyidae

Muggiaea atlantica Cunningham, 1892

M. kochi (Will, 1844)

Classe Anthozoa (larvas)

FILO CTENOPHORA

FILO PLATYHELMINTHES

Classe Turbellaria

FILO NEMATODA

FILO ANNELIDA

Classe Polychaeta

FILO MOLLUSCA

Classe Gastropoda

Subclasse Opisthobranchia

Ordem Thecosomata ("Pteropoda")

Família Cavoliniidae

Creseis acicula (Rang, 1828)

Família Limacinidae

Limacina sp.

Limacina bulimoides (d'Orbigny, 1836)

L. inflata (d'Orbigny, 1836)

L. trochiformis (d'Orbigny, 1836)

Classe Bivalvia

Subclasse Pteriomorpha

Ordem Mytilloidea

Família Mytillidae

Ordem Ostreoidea

Família Ostreidae

Ostrea sp.

Classe Cephalopoda (larvas)

FILO ARTHROPODA

Subfilo Insecta

Subfilo Crustacea

Classe Branchiopoda

Ordem Ctenopoda (=Cladocera parte)

Família Sididae

Penilia avirostris Dana, 1852

Ordem Onychopoda (=Cladocera parte)

Família Podonidae

Evadne spinifera (Müller, 1867)

Pleopis polyphemoides (Leuckart, 1850)

[=Podonpolyphemoides]

Pleopis schmackeri (Poppe, 1889)

Podon sp.

Podon intermedius (Lilljeborg, 1853)

Pseudevadne tergestina (Claus, 1877) [=Evadne tergestina]

Classe Maxillopoda

Subclasse Ostracoda

Ordem Myodocopa

Família Conchoecidae

Conchoecia sp.

Subclasse Copepoda

Ordem Calanoida

Família Acartiidae

Acartia lilljeborgi (Giesbrecht, 1892)

A. longiremis (Lilljeborg, 1853)

A. tonsa (Dana, 1849)

Família Calanidae

Calanoides carinatus (Kroyer, 1849)

Família Centropagidae

Centropages velificatus (Oliveira, 1947)

Família Clausocalanidae

Clausocalanus furcatus (Brady, 1883)

Ctenocalanus citer (Heron & Bowman, 1971)

C. vanus (Giesbrecht, 1888)

Família Eucalanidae

Subeucalanus monachus (Giesbrecht, 1888)

S. pileatus (Giesbrecht, 1888)

S. subtenuis (Giesbrecht, 1888)

Família Euchaetidae

Euchaeta marina (Prestrandrea, 1833)

Família Mecynoceridae

Mecynocera clausi Thompson, 1888

Família Paracalanidae

Acrocalanus longicornis Giesbrecht, 1888

Calocalanus pavo (Dana, 1849)

C. pavoninus (Farran, 1936)
Delius sewelli (Bjornberg, 1980)
Paracalanus sp.
Paracalanus aculeatus (Giesbrecht, 1888)
P. indicus (Wolfenden, 1905)
P. parvus (Claus, 1863)
P. quasimodo Bowman, 1971
Parvocalanus crassirostris (Dahl, 1894)

Família Pontellidae

Calanopia americana (Dahl, 1894)
Labidocera fluviatilis (Dahl, 1894)
Pontellopsis brevis (Giesbrecht, 1889)

Família Pseudodiaptomidae

Pseudodiaptomus sp.
Pseudodiaptomus acutus (Dahl, 1894)

Família Temoridae

Temora stylifera (Dana, 1849)
T. turbinata (Dana, 1849)

Ordem Poecilostomatoida

Família Corycaeidae

Corycaeus sp.
C. (Corycaeus) speciosus (Dana, 1849)
C. (Ditrichocorycaeus) amazonicus (Dahl, 1894)
C. (Onychocorycaeus) giesbrechti (Dahl, 1894)
C. (Onychocorycaeus) ovalis (Claus, 1863)
Farranula gracilis (Dana, 1853)

Família Oncaeidae

Oncaea sp.
Oncaea conifera (Giesbrecht, 1891)
O. curta (Sars, 1916)
O. media (Giesbrecht, 1891)
O. subtilis (Giesbrecht, 1892)
O. venusta (Philippi, 1843)

Família Sapphirinidae

Copilia mirabilis (Dana, 1849)
Sapphirina sp.

Ordem Cyclopoida

Família Oithonidae

Oithona hebes (Giesbrecht, 1891)
O. nana (Giesbrecht, 1892)
O. oligohalina (Fonseca & Bjornberg, 1976)
[=Ohebes, Santos 1973; =O. oswaldocruzi Oliveira, 1945].

O. ovalis Herbst, 1955 [= *O. oswaldocruzi* Oliveira, 1945]

O. plumifera (Baird, 1843)

O. setigera (Dana, 1849)

O. simplex (Farran, 1913)

O. similis (Claus, 1866)

Ordem Harpacticoida

Família Clytemnestridae

Clytemnestra scutellata (Dana, 1848)

Família Ectinosomatidae

Microsetella sp.

M. rosea (Dana, 1847)

Família Euterpinidae

Euterpina acutifrons (Dana, 1847)

Família Miraciidae

Macrosetella gracilis (Dana, 1848)

Subclasse Cirripedia

Ordem Thoracica

Subordem Balanomorpha

Balanus sp. (larvas)

Classe Mallacostraca

Subclasse Eumallacostraca

Ordem Stomatopoda (larvas)

Ordem Amphipoda

Ordem Isopoda

Ordem Mysidacea

Ordem Tanaidacea

Ordem Euphausiacea

Ordem Decapoda

Subordem Dendrobranchiata

Infraordem Penaeidea

Família Penaeidae (larvas)

Penaeus sp.

Trachypenaeus sp.

Xiphopenaeus sp.

Família Sergestidae

Família Luciferidae

Lucifer sp.

Lucifer faxoni (Borradaile, 1915)

Subordem Pleocyemata

Infraordem Caridea

Família Alpheidae (larvas)

Família Palaemonidae (larvas)

<p>Família Hippolytidae (larvas)</p> <p>Infraordem Thalassinidea</p> <p>Família Callianassidae (larvas)</p> <p>Infraordem Anomura</p> <p>Família Diogenidae (larvas)</p> <p>Família Paguridae (larvas)</p> <p>Família Porcellanidae (larvas)</p> <p>Infraordem Brachyura</p> <p>Família Majidae (larvas)</p> <p>Família Portunidae (larvas)</p> <p>Família Xanthidae (larvas)</p> <p>Família Grapsidae (larvas)</p> <p>Família Ocypodidae (larvas)</p>
FILO ECHINODERMATA
Classe Echinoidea (larvas)
FILO PHORONIDA (LARVAS)
FILO BRYOZOA (LARVAS)
FILO CHAETOGNATHA
<p>Classe Sagittoidea</p> <p><u>Ordem Aphragmophora</u></p> <p>Subordem Ctenodontina</p> <p>Família Sagittidae</p> <p><i>Ferosagitta hispida</i> (Conant, 1895)</p> <p><i>Flaccisagitta enflata</i> (Grassi, 1881)</p> <p><i>Mesosagitta minima</i> (Grassi, 1881)</p> <p><i>Parasagitta friderici</i> (Ritter-Zahony, 1911)</p> <p><i>P. tenuis</i> (Conant, 1896)</p> <p><i>Sagitta</i> sp.</p> <p>Subordem Flabellodontina</p> <p>Família Krohnittidae</p> <p><i>Krohnitta</i> sp.</p> <p><u>Ordem Monophragmophora</u></p> <p>Família Spadellidae</p> <p><i>Spadella</i> sp.</p>
FILO CHORDATA
<p>Subfilo Hemichordata (larvas)</p> <p>Subfilo Urochordata</p> <p>Classe Appendicularia</p> <p>Família Fritillariidae</p> <p><i>Fritillaria</i> sp.</p>

Fritillaria formica (Fol, 1872)

F. haplostoma (Fol, 1872)

Família Kowalevskiiæ

Kowalevskia sp.

Família Oikopleuridae

Oikopleura sp.

Oikopleura albicans (Leuckart, 1854)

O. dioica (Fol, 1872)

O. fusiformis (Fol, 1872)

O. gracilis (Lohmann, 1896)

O. intermedia (Lohmann, 1896)

O. longicauda (Vogt, 1854)

O. rufescens (Fol, 1872)

Classe Ascidiacea (larva)

Classe Thaliacea

Ordem Doliolida

Família Doliolidae

Doliolum nationalis (Borgert, 1893)

Ordem Salpida

Família Salpidae

Salpa sp.

Thalia democratica (Forskål, 1775)

Subfilo Cephalochordata

Branchiostoma sp.